

## **LES PANCRÉATITES AIGUES**

### **Définition :**

La pancréatite aiguë est une inflammation aiguë du pancréas, caractérisée par une autodigestion glandulaire.

Il existe deux formes cliniques de pancréatite aiguë : pancréatite aiguë œdémateuse (bénigne, 80 % des PA) et pancréatite aiguë nécrotico-hémorragique (grave, 20 % des PA).

### **Signes cliniques :**

La douleur abdominale est d'apparition rapide et brutale, intense, permanente avec la caractéristique position antalgique en chien de fusil. Elle est associée à une fièvre, une défense abdominale, des vomissements et un iléus réflexe.

La pancréatite aiguë peut se compliquer d'un choc hypovolémique, d'une oligo-anurie, ainsi que de troubles neuropsychiques et respiratoires.

### **Signes paracliniques :**

#### **Signes biologiques :**

Dosage des enzymes pancréatiques dans le sang ➡ lipasémie > 3N (meilleure spécificité et sensibilité).

Autres paramètres utiles pour établir le score pronostic de RANSON ➡ Glycémie, leucocytes, LDH, ASAT.

#### **Signes radiologiques :**

La tomodensitométrie permet d'évaluer les lésions et de calculer le score pronostic de BALTHAZAR.

### **Causes :**

Les principales causes de PA ➡ Lithiase biliaire et alcoolisme.

### **Traitement :**

Le traitement repose sur les mesures de réanimation symptomatiques, et la chirurgie en cas de nécrose pancréatique.